

Modul 5c: Phasen der Geburt - Nachgeburt

Factsheet "Nachgeburtsphase":

- Die fetalen Häute benachbarter Feten sind meist zusammengewachsen
- Der grösste Teil der Nachgeburt wird meist 4h nach der Geburt geboren
- Seltener wird die Nachgeburt in 2-3 Teilen geboren, oder in kleine Massen, einzeln nach jedem Ferkel
 - In diesen Fällen ist die 2. und 3. Geburtsphase nicht klar zu trennen, da Austreibung und Nachgeburtsphase gleichzeitig erfolgen
- Wenn die Sau die Möglichkeit dazu hat, frisst sie meist die Nachgeburt
- Nach der Geburt des letzten Ferkels steht die Sau meistens auf und uriniert und legt sich danach wieder hin
- Das Säugen der Ferkel (Oxytocin-Ausschüttung) stimuliert Kontraktionen im Uterus, um Nachgeburt auszutreiben

Hypothesen zur Plazentophagie

- Plazenta wird gefressen, um die Gerüche einer frischen Geburt zu entfernen und so zu verhindern, dass Raubtiere angelockt werden.
- Plazenta wird gefressen, da sie Nährstoffe und Hormone enthält, die die Milchproduktion anregen.
- Plazenta wird gefressen, da dies einen analgetischen Effekt auslösen soll.